

冠状动脉造影术后动眼神经不全麻痹一例

廖玉巍

(民航沈阳医院内科, 辽宁省沈阳市 110043)

患者, 女性, 58 岁, 工人, 汉族, 已婚, 2001 年 8 月以“心悸待查, 冠状动脉粥样硬化”为诊断入院, 需要进行冠状动脉造影(CAG) 以明确诊断。既往健康, 否认高血压、糖尿病及高脂血症病史。查体: 一般状态佳, 无阳性体征。患者于局麻下行 CAG 术。结果显示: LM 正常, CAO 近段 30% 狭窄, LCX 正常, RCA 近段 20% 狭窄, LV 正常。术后患者自诉视物模糊, 体查发现: 双睑运动正常, 眼球运动不受限, 双侧瞳孔等大正圆, 对光反射灵敏, 眼底镜见左眼底鼻

上支迂曲, 变细。翌日, 患者自诉视物“重影”, 查体: 双睑运动正常, 左眼外上斜位, 左眼球向上‘下’内运动受限。双侧瞳孔等大正圆, 对光反射灵敏, 小瞳下眼底未见异常。考虑: 左眼动眼神经不全麻痹。给予胞二磷胆碱及 B 族维生素治疗两周后, 患者仍诉视物“重影”, 查体: 双睑运动正常, 双眼未见明显斜位, 左眼眼球向上‘下’内运动略受限, 双侧瞳孔等大正圆, 对光反射灵敏, 小瞳下眼底未见异常, 诊断: 左眼动眼神经不全麻痹, 冠状动脉粥样硬化。

(此文编辑 文玉珊)

[收稿日期] 2001-11-27