

逐瘀通脉胶囊治疗急性缺血性心脑血管卒中的疗效

张全贵, 张 莉

(中国人民解放军第 272 医院干部病房, 天津市 300020)

[关键词] 内科学; 脑卒中; 不稳定型心绞痛; 急性心肌梗死; 逐瘀通脉胶囊/疗效

目的 观察逐瘀通脉胶囊(三精千鹤制药)治疗急性缺血性心脑血管卒中的临床疗效。**方法** 治疗组 56 例急性缺血性心脑血管卒中, 30 例为脑卒中, 其中男 18 例, 女 12 例, 年龄 66.7 ± 5.8 岁; 26 例为心卒中, 其中男 14 例, 女 12 例, 不稳定型心绞痛 20 例, 急性心肌梗死 6 例。对照组 30 例中, 男 16 例, 女 14 例, 年龄 65.2 ± 4.9 岁。其中急性脑梗死 18 例, 不稳定型心绞痛 10 例, 急性心肌梗死 2 例。对照组: 急性脑梗死、不稳定型心绞痛和急性心肌梗死分别按我国有关指南标准治疗。治疗组: 在对照组基础上加逐瘀通脉胶囊 2 粒, 每日 3 次, 1 个月为一疗程。脑梗死评定依据神经功能缺损积分值的减少, 结合患者生活能力状态分为 4 级: 基本痊愈、显著进步、进步、无变化。总有效率包括前三者。心绞痛改善参考心绞痛分级, 结合心电图改善情况将疗效分为显效、有效和无效。总有效率包括前二者。2 组均于治疗前后检查血液流变学和血脂等指标。**结果** (1) 脑梗死: 治疗组的基本治愈、显著进步、进步、总有效率分别为 41.1%、37.5%、14.3%、92.8%; 对照组分别为 30.0%、26.7%、10.0% 和 66.7%, 两组比较有显著差异。(2) 不稳定性心绞痛: 治疗组的显效、有效和总有效率分别为 30.0%、35.0% 和 85.0%; 对照组分别是 30.0%、40.0% 和 70.0%, 两组比较有显著差异。(3) 血液流变学: 治疗组的全血黏度、血浆黏度和血小板聚集率较对照明显降低。(4) 血脂: 治疗组的总胆固醇、甘油三酯较对照组降低, 高密度脂蛋白胆固醇升高。**结论** (1) 逐瘀通脉胶囊能显著改善脑梗死患者的临床症状、神经功能缺损, 提高生活质量, 是治疗缺血性脑卒中的有效药物。(2) 逐瘀通脉胶囊可显著改善冠心病胸闷、心悸等临床症状和心电图缺血改变, 表明本药可有效治疗冠心病心绞痛。(3) 逐瘀通脉胶囊能改善血液流变有关指标, 调节血脂, 提示更适宜伴血黏度高, 血脂高的缺血性心脑血管卒中患者。逐瘀通脉胶囊治疗缺血性心脑血管卒中的机理: 抑制血小板聚集, 抑制凝血酶, 抗血栓形成, 溶解血栓; ④降低全血黏度和血浆黏度; ④调节脂质代谢; 扩张血管, 降低血管阻力, 改善微循环。

(此文编辑 胡必利)