

# 参松养心胶囊治疗冠心病心绞痛伴室性早搏的临床疗效

张全贵

(中国人民解放军 272 医院, 天津市 300020)

[关键词] 参松养心胶囊; 冠心病; 心绞痛; 室性早搏

**目的** 观察参松养心胶囊治疗冠心病心绞痛伴室性早搏的临床疗效。**方法** 选择符合世界卫生组织制定的《缺血性心脏病的命名及诊断标准》患者 96 例, 随机分为治疗组和对照组。治疗组 48 例, 伴室性早搏 31 例, 其中男 26 例, 女 22 例, 年龄  $61.1 \pm 2.0$  岁; 对照组 48 例, 伴室性早搏 28 例, 其中男 24 例, 女 24 例, 年龄  $60.7 \pm 6.0$  岁。对照组给予硝酸酯类药物、 $\beta$ 受体阻滞剂、钙拮抗剂、血小板抑制剂和抗心律失常等药物, 重者静滴硝酸酯类药物。治疗组在对照组治疗的基础上口服参松养心胶囊(以岭公司生产) 1.2 g 一日三次。30 天为一疗程。观察治疗前后心绞痛发作和心电图 ST-T 变化情况, 根据《冠心病心绞痛及心电图疗效判定标准》进行疗效评价。**结果** 治疗组显效率和总有效率较治疗前明显提高 ( $P < 0.01$ ), 也较对照组治疗后提高 ( $P < 0.05$ )。心电图改善总有效率在治疗组为 76.3%, 对照组为 60.4%, 两组比较差异显著 ( $P < 0.01$ )。两组治疗后室性早搏均明显减少, 治疗组(总有效率 87.5%) 较对照组(62.6%) 减少更明显 ( $P < 0.05$ )。**结论** 在常规治疗的基础上, 加用参松养心胶囊能提高冠心病心绞痛和心电图疗效, 对伴有室性早搏患者更适宜。

(此文编辑 文玉珊)